

Checklist risico- factoren ADHD

De risico's van de aanwezigheid van (of combinaties van) de volgende items dienen bij de (her)keuring te worden afgewogen:

1. Co-morbiditeit

- Actueel misbruik van middelen, met name alcohol en drugs.
Dit komt voor bij 20 - 30 % van de personen met ADHD. Op indicatie moet het onderzoek worden aangevuld met bloedonderzoek (gamma-GT, ALAT, ASAT) en/of urineonderzoek (drugs).
- Aanwezigheid van een onbehandelde angststoornis en/of depressieve stoornis.
Dit komt voor bij 30 - 40 % van de personen met ADHD.
- Aanwezigheid van een borderline of antisociale persoonlijkheidsstoornis, met name met onverantwoordelijk gedrag.

2. Gebruik van (psycho) farmaca

- Gebruik van verschillende (psychofarmaca).
- Mede gebruik van sederende geneesmiddelen, met name benzodiazepinen of sederende antidepressiva.

3. Voorgeschiedenis in het verkeer

- Voorgeschiedenis van ernstige ongelukken (bijvoorbeeld met letsel, dodelijke afloop, veel schade).

4. Inzicht en attitude

- Inzicht in de eigen beperkingen.
- Inzicht in de belangrijke aspecten van de behandeling van ADHD en het meewerken daaraan (zoals therapietrouw of compliance aan methylfenidaat, gebruik van timer en afspraken met behandelaar nakomen).